

CONSEILS APRES LES INJECTIONS

- 1/ Eviter les mimiques pendant 24 heures
- 2/ Prévoir de la glace à appliquer sur les zones traitées après les injections pendant la première journée. Ne pas appliquer les glaçons directement au contact de la peau. Placer les glaçons dans un sac plastique, introduire le sac dans un gant ou un linge mouillé.
- 3/ Eviter l'exposition au soleil pendant 48 heures. 4/ Respecter le traitement prescrit.
- 5/ Une consultation de contrôle est prévue à la 48^e heure puis à 10 jours pour une éventuelle correction.
- 6/ Une nouvelle injection effectuée vers le 4^e mois permet de maintenir les résultats bien souvent au delà de 1 an.

Evenements indésirables prévisibles

Quelques réactions liées au traumatisme mécanique des injections peuvent se produire : Légère rougeur qui disparaît au bout de 24 à 48 heures, macule au point d'implantation. Il est important de masser et de modeler les éventuelles bosselures afin de minimiser les irrégularités superficielles de la peau.

Un gonflement local (lèvres) se résorbe spontanément en 1 à 2 jours ; une contusion locale en 2 à 3 jours.

Docteur Eric ESSAYAGH

Docteur Eric Essayagh
Diplômé de la Faculté de Médecine de Dijon
Diplômé Inter Universitaire en Médecine Morphologique et Anti-âge
Diplôme Inter Universitaire Européen des Lasers Médicaux
Diplôme Universitaire en Anatomie Morphologique des Tissus Superficiels Appliquée
Diplôme Inter Universitaire de Mésothérapie
Diplôme Universitaire d'évaluation et de contrôle des techniques d'injection et de comblement en Dermatologie
et Chirurgie Plastique
N°06 1 09601 2/ 0 1 24 1
